



Aanvraagformulier anti-decubitus materiaal

Formulier dient ingevuld te worden door behandelend arts



Naam:

Adres:

Postcode / woonplaats:

Telefoonnummer:

Relatienummer: Geboortedatum:

betreffend hokje aankruisen / doorhalen wat niet van toepassing is

AD-materiaal komt alleen voor vergoeding (in bruikleen) in aanmerking indien de patiënt hierop langdurig is aangewezen i.v.m. een verhoogd risico voor het ontstaan van decubitus. AD-materiaal te gebruiken als matras bij b.v. ligproblemen of rugklachten komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Aanspraak op AD Materiaal bestaat indien de verzekerde langer dan 6 maanden op het gebruik van deze hulpmiddelen is aangewezen. Zolang niet vaststaat dat de gebruiksduur langer is dan 6 maanden, moet de verzekerde in eerste instantie de hulpmiddelen lenen op grond van de AWBZ via een daartoe bevoegde leverancier. AD materiaal dient de eerste 3 maanden te worden geleend bij het uitleenmagazijn van de AWBZ (bijvoorbeeld thuiszorg), indien het nadien nog nodig is dan kan een aanvraag voor verstrekking in bruikleen worden ingediend.

Uitgebreide medische indicatie:

.....

.....

.....

Hoeveel tijd wordt in bed doorgebracht? minder dan 10 uur van 10 tot 15 uur meer dan 15 uur

Wordt het matras preventief of curatief ingezet? preventief curatief

Stadium decubitus: niet wegdrubbare roodheid/cyanose locatie decubitus

blaarvorming

oppervlakkige decubitus

diepe decubitus

Soort matras: vezelmatras / drukverdelend matras / statisch luchtmatras / opleg watermatras / low air matras / wisselgigging matras

Gebruikt patiënt een AD-matras via het uitleenmagazijn van de AWBZ: ja nee

zo nee, waarom niet.

zo ja, wanneer is de uitleenperiode verlopen.

Onderstaande alleen invullen indien u geen bestaande risicoscorelijst van bijvoorbeeld de thuiszorg verstuurt.

Risicofactoren en risicoscore:	punten	Ingevuld door:
1. Mentale toestand	Naam:
2. Neurologie	Functie:
3. Mobiliteit	Datum:
4. Voedingstoestand	
5. Voedsel eten / drinken	
6. Incontinentie	
7. Leeftijd	
8. Temperatuur	
9. Medicatie	
10. Diabetes	Totaalscore: punten

Risicoscorelijst decubitus

Aantal punten	0	1	2	3
Mentale toestand	goed	lusteloos, gedeprimeerd, gedesoriëteerd, angstig	zwaar depressief, psychotisch verward, volledig apathisch	stuporeus comateus
Neurologie	geen afwijkingen	geringe stoornissen, krachtsverminderingen	sensibiliteitsstoornissen, lichte hemiparese (x 2)	hemiparese (2 maal de score) dwarslaesie (onder Th 6 = 3 maal de score, boven Th 6 = 4 maal de score)
Mobiliteit	goed	licht beperkt, loopt met hulp, rolstoelpatiënt met goede armfunctie	voornamelijk bedlegerig, alleen uit bed bij wassen en bed verschonen, hele dag passief in de stoel	geheel bedlegerig
Voedingstoestand	goed: goed gewicht, gezonde eetlust, albumine 30 - 50 g/l	ongewenst gewichtsverlies (> 5% binnen 6 maanden; 2,5% binnen 1 maand), verminderde eetlust, albumine < 35 g/l	ongewenst gewichtsverlies (> 10% binnen 6 maanden; 5% binnen 1 maand) bij braken of diarree, sterk verminderde eetlust, albumine < 30 g/l	ongewenst gewichtsverlies (> 20% binnen 6 maanden; 10% binnen 1 maand), geen eetlust, albumine < 20 g/l
Voedsel (eten en drinken)	voedsel inname volgens de aanbevolen hoeveelheden, volledige sondevoeding, volledige parenterale voeding	meer dan 1 week minder gegeten dan de aanbevolen hoeveelheden, gedeeltelijke sonde of parenterale voeding en geen overige voeding	meer dan 5 dagen nauwelijks voedsel inname, gedeeltelijke bijvoeding en geen overige voeding	meer dan 5 dagen geen voeding en geen suppletie, langer dan 5 dagen een glucose / NaCl infuus
Incontinentie	geen	af en toe urine	voor urine en / of faeces bij urinecatheter, uritip	geheel incontinent
Leeftijd	jonger dan 50 jaar	ouder dan 50 jaar	ouder dan 60 jaar	ouder dan 70 jaar
Temperatuur	lager dan 37,5	hoger dan 37,5	hoger dan 38,5	hoger dan 39,0 of lager dan 35,0
Medicatie	geen	corticosteroiden, anti-coagulantia (niet calperine)	slaapmiddelen, pijnstillers, tranquilizers, orale antibiotica	parenterale antibiotica
Diabetes	geen	alleen dieet	dieet / orale middelen	dieet / insuline

Voor de berekening van het percentage gewichtsverlies geldt de volgende formule:

$$\% \text{ gewichtsverlies} = \frac{\text{normale gewicht} - \text{huidige gewicht}}{\text{normaal gewicht}} \times 100$$



Dit formulier kunt u sturen naar CZ, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de CZ Klantenservice, telefoonnummer 0900 - 0949.